

**PNASA 2026 - 01/08/2025 a
31/07/2026**

	Medicamento	Composição Substância Ativa	Tratamentos/Duração	Nº de colônias tratadas por embalagem	Altura do ano para aplicação - Recomendação
Químico	 Apivar	Amitraz 500mg	2 tiras por colmeia de 10 a 12 semanas.	5	Dezembro/ Janeiro ou Pós-Cresta
	 Apitraz				
	 Apistan	Tau- Fluvalinato	2 tiras por colmeia de 8 a 10 semanas.		
	 Amicel	1 ml contem 25mg de amitraz	2 aplicações , uma tira de cada vez. A 2ª tira colocar passados 12 dias. Após 35 dias retirar restos.	1 Litro - 50 220ml - 11	Pós-Cresta
Biológico	 Varromed	5 mg/ml de ácido fórmico e 44mg/ml de ácido oxálico	Dosagem calculada para 15 ml por colmeia em duas aplicações, intervalo de 6 dias.	18	Qualquer altura
	 Formivar 60	Ácido Fórmico a 60%	Com evaporador - 1 aplicação. Para libertação rápida, no mínimo 3 aplicações (min 20ml) com intervalo de 8 dias.	16	Primavera/ Outono
	 Varroxal	Ácido Oxálico em pó	Por <u>sublimação</u> - 2g por colmeia, Pulverização - 2,5 a 3,5 ml/lado/quadro. Gotejamento - 30 a 40 ml colmeia	75g - 37 200g - 100	Dezembro/ Janeiro
	 Calistrip Biox	Ácido Oxálico di-hidratado	2 tiras por colmeia durante pelo menos 6 semanas.	5	Dezembro/ Janeiro
	 Formic Pro 68,2g	Ácido Fórmico	Tratamento recomendado para temperaturas entre os 15 e 25º . Financiamento de 1 tratamento que dá para tratar duas colmeias - 1 ou 2 aplicações 1/2 tira + 1/2 tira	Caixa de 10 ou 30 embalagens	Primavera/ Outono